Module sur Rougeole

Destiné au Centre de Santé d'Éthiopie

(Ethiopian Health Center Team)

Université d'Alemaya

1.2 Instructions d’utilisation de ce module

Lisez la table des matières ;

Répondez aux questions du test préliminaire et évaluez vos connaissances ;

Lisez et assimilez les objectifs pédagogiques ;

Lisez attentivement chaque chapitre avant de passer au chapitre suivant ;

Répondez aux questions du test d’évaluation et évaluez vos connaissances ;

Consultez les références pour plus d’informations sur le sujet.



connaissent des épidémies de rougeole fréquentes. Des épidémies majeures associées à des taux d'attaque élevés, entraînant un taux de létalité de pas moins de 15 à 20 %, ont été signalées dans le pays. Dans un contexte non épidémique, le taux de létalité de la rougeole est compris entre 3 et 5 %.

La rougeole génère des coûts très importants, mesurés en nombre d'années de vie en bonne santé perdues et en perte de productivité. Selon les rapports de routine remis par les établissements de soins au ministère éthiopien de la Santé entre 1980 et 1990, l'incidence de la rougeole était très élevée chez les enfants de moins de 15 ans, et notamment dans le groupe des 1 à 4 ans.

2.3 Objectifs pédagogiques

À la fin du présent module, les participants devront être en mesure de :

- Citer l'agent étiologique de la rougeole ;
- Apprécier la gravité, la sévérité et les conséquences de la maladie ;
- Décrire l'histoire naturelle de la maladie ;
- Identifier les facteurs de risque associés à la maladie ;
- Connaître la répartition et les déterminants de la maladie ;
- Dresser la liste des manifestations cliniques et des éléments de diagnostic ;
- Établir une définition de cas ;
- Prendre en charge la rougeole et ses complications ;
- Déterminer quels sont les facteurs qui contribuent à une mauvaise couverture vaccinale contre la rougeole ;
- Faire la différence entre les vraies et les fausses contre-indications à la vaccination contre la rougeole ;
- Concevoir des stratégies d'intervention et des mécanismes de prévention et de lutte contre la rougeole.

2.4 Étude de cas : activité pédagogique

Marta est une fillette de 2 ans originaire du kebele Sugale, dans la zone Gedeo.

2.5 Définition

La rougeole est une maladie virale aiguë hautement contagieuse, caractérisée par une fièvre, une rhinite (écoulement nasal), une toux, une irritabilité, une conjonctivite/un larmoiement et un énanthème (signe de Koplik) sur la muqueuse buccale et labiale. À ces symptômes succède une éruption maculo-papuleuse accompagnée d'une forte fièvre, qui débute au niveau de la tête, du cou et du visage avant de s'étendre progressivement au thorax, aux bras et aux jambes et d'atteindre les pieds le troisième jour.

2.6 Étiologie et pathogenèse

L'organisme pathogène à l'origine de la rougeole est un virus. Le virus de la rougeole (VR), un virus enveloppé à ARN simple brin et à polarité négative, appartient au genre Morbillivirus, de la famille des paramyxovirus. Il s'agit d'un virus à ARN appartenant à un groupe de myxovirus. Le VR est un agent pathogène efficace qui persiste lorsqu'une population est suffisamment importante pour permettre sa propagation. Néanmoins, il ne provoque une infection aiguë qu'une seule fois dans la vi

/année à l'Organisation mondiale de la santé, la plupart en Afrique. En 1998, le nombre de cas de rougeole signalés à l'OMS pour 100 000 habitants se montait à 1,6 dans la région des Amériques, 8,2 dans la région européenne, 11,1 dans la région de la Méditerranée orientale, 4,2 dans la région de l'Asie du Sud

sévérité de la rougeole soit en partie due aux différences d'incidence entre les complications éventuelles telles que la pneumonie, l'otite moyenne, la diarrhée, la malnutrition protéino-énergétique, la carence en vitamine A et la réactivation des pathologies préexistantes comme la tuberculose et le VIH/SIDA.

Services de vaccination insuffisants : il s'agit du principal facteur de risque.

Immunité maternelle : les anticorps maternels protègent généralement les nourrissons des mères immunisées jusqu'à l'âge de 6 mois au moins. Les études sur les anticorps révèlent que la plupart des enfants de moins de 6 mois développent une infection subclinique lorsqu'ils sont exposés au virus



Les patients sont généralement asymptomatiques. Chez certaines personnes, la primo-infection peut entraîner des symptômes (fièvre, éruption cutanée et symptômes respiratoires dus à la présence du virus dans le sang) qui apparaissent dans les 2 à 3 jours suivant l'exposition au virus.

Le début de la maladie se manifeste par des symptômes caractéristiques de la phase catarrhale initiale (prodromique), qui dure généralement 3 à 5 jours :

fièvre légère ou modérée (38-39°C)
yeux rouges/larmoiement
écoulement nasal/rhinite
toux

Ces symptômes sont presque toujours suivis de l'apparition du signe de Koplik, pathognomonique de la rougeole, généralement visible sur la muqueuse buccale. Le signe de Koplik consiste en l'apparition de taches rouge vif présentant en leur centre un petit point blanc grisâtre de 1 à 2 mm de diamètre, généralement aussi petit que qu'un grain de sable. Ces taches sont généralement situées sur la muqueuse buccale, en regard des molaires inférieures, mais peuvent se propager de manière irrégulière sur le reste de la muqueuse buccale. Elles disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues, en 12 à 18 heures généralement.

Éruption maculo-papuleuse rougeâtre (érythémateuse) progressant de la tête vers les pieds. L'éruption cutanée survient le troisième jour après l'apparition de la fièvre, de la toux et de la rhinite. Généralement, la fièvre s'élève et atteint fréquemment 40°C, ce qui coïncide avec l'apparition de l'éruption cutanée. L'éruption débute généralement par l'apparition de macules pâles sur les parties latérales supérieures du cou, derrière les oreilles, à la naissance des cheveux, et à l'arrière du cou. Les lésions isolées deviennent progressivement maculo-papuleuses à mesure que l'éruption s'étend sur l'ensemble du cou, les bras et le haut du thorax au cours des premières 24 heures. Au cours des 24 heures suivantes, elle gagne le dos, l'abdomen, les avant-bras et les cuisses. Lorsqu'elle atteint enfin les pieds entre le deuxième et le troisième jour, elle

comment à s'estomper sur le visage. L'éruption disparaît en suivant la même progression qu'au moment de son apparition. La sévérité de la maladie est directement liée à l'ampleur et à la confluence de l'éruption.

L'enfant est irritable. Souvent, il cesse de s'alimenter et boit moins.

Complications de la rougeole

Les principales complications de la rougeole sont les suivantes :

Environ 30 % des cas de rougeole signalés s'accompagnent d'une ou plusieurs complications. Les complications les plus fréquentes sont les suivantes :

Diarrhée (



Une infection rougeoleuse en cours de grossesse augmente le risque de travail

une éruption

Le virus peut être détecté à un stade précoce de la maladie par immunofluorescence

directe des cellules épithéliales

Scarlatine :

- Signes et symptômes de pharyngite principalement ;
- Leucocytémie élevée (leucocytose) ;
- Absence de signe de Koplik ;
- Toux non sévère et absence de conjonctivite ;
- L'éruption donne l'impression que le patient a la chair de poule ou donne à la peau l'aspect du papier de verre, et n'est pas caractérisée par une progression de la tête vers les pieds, contrairement à la rougeole.

Diphtérie laryngée

Croup sévère, d'évolution parfois descendante, mais principalement localisé ;

Enrouement, stridor, dyspnée, toux croupale ;

Une membrane grise est visible dans la gorge ;

Absence relative de fièvre ;

Absence de l'éruption caractéristique de la rougeole.

Laryngotrachéobronchite aiguë/croup

Mégalérythème épidémique (5^{e} maladie)

- Symptômes d'une infection respiratoire bénigne ;
- Éruption érythémateuse touchant le visage, qui donne l'impression d'avoir été giflé. Elle est suivie de l'extension rapide d'un érythème maculaire diffus au thorax et aux extrémités proximales.

  Prédominante sur les faces d'extension ;

  Épargne les paumes et la plante des pieds.

- L'enfant n'a pas de fièvre et ne semble pas malade.

Infections à entérovirus :

- Fièvre, malaise ;
- Pharyngite, rhinite ;
- Conjonctivite légère ;
- Lymphadénopathie cervicale ;

Traitement symptomatique et d'appoint principalement :

- Antipyrétiques (paracétamol)

2.11 Prévention et lutte contre la rougeole

Le patient est susceptible de transmettre le virus avant même que la maladie puisse être diagnostiquée, soit 9 à 10 jours après l'exposition, et parfois dès 7 jours après.
Des mesures d'isolement doivent être prises par les hôpitaux et autres établissements notamment dès le 7^{e} jour suivant l'exposition, et être maintenues jusqu'à 5 jours après l'apparition de l'éruption cutanée.

Stratégies de vaccination contre la rougeole dans les pays en développement :

Dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV), il est recommandé de vacciner les enfants des pays en développement dès l'âge de 9 mois avec une dose unique de vaccin vivant atténué. En raison de la présence d'anticorps maternels, seuls 80 à 90 % d'entre eux acquièrent une immunité à cet âge. Dans les pays développés, la vaccination contre la rougeole est reportée à l'âge de 15 mois ou plus afin d'éviter les interférences avec les anticorps maternels.

La lutte contre la rougeole vise à réduire la mortalité et la morbidité dues à cette maladie à un niveau auquel elle n'est plus considérée comme un problème majeur de santé publique, c'est-à-dire réduire la morbidité de 90 % et la mortalité de 95 %. L'Éthiopie, où la couverture vaccinale contre la rougeole est inférieure à 60 % et la mortalité élevée (taux de létalité > 4 %), a fait des efforts pour améliorer cette couverture vaccinale, notamment dans les zones où elle est particulièrement mauvaise, et pour améliorer la prise en charge des cas, afin d'atteindre les objectifs de réduction de la morbidité et de la mortalité. (Ministère de la Santé, 1999).

Pourquoi « un enfant n'est-il pas vacciné ? »

Causes fréquentes de l'échec de la vaccination :

1. Mères insuffisamment informées.
    1.1. Ignorent la nécessité de la vaccination

Stratégies et activités majeures :

1. Augmentation de la couverture vaccinale de routine contre la rougeole chez les enfants de moins d'un an :

Amélioration et maintien d'une couverture vaccinale élevée dans les zones à haut risque, en veillant à vacciner les enfants le plus tôt possible, dès l'âge de 9 mois ;

Information, éducation et communication (IEC) régulières et intensives/campagnes de mobilisation sociale pour rappeler aux parents et aux dirigeants de la communauté l'importance de la vaccination contre la rougeole dès l'âge de 9 mois ;

La couverture vaccinale contre la rougeole doit être surveillée à l'échelle des woredas afin d'identifier les zones où elle est insuffisante et élaborer des stratégies appropriées.

2. Activités de vaccination complémentaires :

Il est important de mettre en place une vaccination de masse afin d'atteindre ces zones à haut risque. Au cours des campagnes de vaccination de masse, une seule dose de vaccin doit être administrée à tous les enfants du groupe d'âge ciblé (c'est-à-dire à tous ceux âgés de 9 à 59 mois, au minimum), quels que soient leur statut vaccinal et leurs antécédents.

Inclusion des enfants de 5 ans et plus dans des programmes de vaccination de masse complémentaires en fonction des données de surveillance de la rougeole et du profil de sensibilité.

3. Mise en place de la surveillance :

Les cas de rougeole conformes à la définition de cas doivent être rapportés dans le cadre du signalement de routine des maladies ciblées par le PEV. Les cas doivent être surveillés à l'échelle des woredas, en fonction de l'âge et du statut vaccinal. Les décès dus à la rougeole doivent être signalés de la même façon.

4. Enquête et riposte appropriées en cas de flambée épidémique

Enquête sur la flambée épidémique : identification des cas par âge, statut vaccinal et autres informations à collecter et à consigner.

Prise en charge appropriée des cas de rougeole.

Prévention de la rougeole nosocomiale (contractée dans les établissements de santé) : il est important d'évaluer le statut vaccinal de l'ensemble des enfants se présentant dans les établissements de santé pendant les épidémies de rougeole. Tous les enfants dont la vaccination n'a pas été consignée dans un carnet doivent recevoir une dose de vaccin au moment de leur admission. Si possible, les patients présentant une éruption cutanée et de la fièvre doivent être isolés des autres.

3. Prise en charge adaptée de la rougeole

Administration de vitamine A, deux fois par an, aux enfants âgés entre 6 mois et 5 ans, notamment dans les zones où la carence en vitamine A est importante.

Stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) : il s'avère que cette stratégie fait partie des interventions les plus rentables en faveur de la survie de l'enfant.

Les algorithmes PCIME de traitement (diagrammes compris) des cas de rougeole compliqués d'une pneumonie, d'une diarrhée ou d'une hypovitaminose A sont applicables. La PCIME est donc la stratégie recommandée dans le cadre du PEV national.

Phases de lutte contre la rougeole

Les programmes de vaccination contre la rougeole comportent quatre phases successives.

1. Phase de lutte contre la rougeole : cette phase vise à améliorer considérablement le taux de couverture vaccinale (> 80 %), à réduire l'incidence de la rougeole et à allonger le délai entre deux flambées épidémiques. Une campagne de vaccination complémentaire sera organisée dans certaines zones à haut risque afin d'améliorer la couverture vaccinale. Cette phrase comporte deux étapes : la réduction de la mortalité et les activités accélérées de lutte contre la rougeole.

2. Phase de prévention des flambées épidémiques de rougeole : une fois que l'amélioration de la couverture vaccinale a permis de réduire considérablement et durablement le nombre de cas de rougeole, la deuxième phase peut être mise en œuvre. Cette phase vise à prévenir les flambées périodiques. Elle comprend la mise en œuvre des stratégies suivantes :

Amélioration de la surveillance afin de comprendre l'évolution de l'épidémiologie de la maladie (évolution de la répartition des cas en fonction de l'âge, des conditions environnementales de transmission de la rougeole, etc.) afin d'identifier les populations les plus à risque.

Prévision et prévention des flambées épidémiques par une vaccination en temps opportun des individus sensibles dans les populations les plus à risque.

Amélioration du taux de couverture vaccinale dans la population générale.

Si une flambée épidémique est attendue, des activités de vaccination complémentaires doivent être prévues.

3. Phase d'élimination de la rougeole : il s'agit de maintenir le nombre d'individus sensibles au sein de la population sous le seuil critique requis afin de maintenir la transmission du virus à son plus bas niveau. Cet effort vise à éliminer la transmission indigène du virus.

4. Phase d'éradication de la rougeole : il s'agit d'un effort mené à l'échelle internationale afin de stopper net la transmission du virus de la rougeole. La phase d'éradication de la rougeole découle de l'ensemble des efforts d'élimination menés avec succès dans tous les pays et dans toutes les régions.

En bref, pour atteindre les objectifs mentionnés ci-

-2dbb0(t)2(i78 Tw - -0.012 Twn l)6(a n)1 0.004 Tc -0

Des épidémies ont été signalées dans les camps de secours éthiopiens au cours de la famine de 1983-1985 et pendant la guerre civile de 1990-91. La plupart des cas ont été signalés dans la région Tigré, les zones Wollo, et à Gondar et Addis-Abeba. Dans le cadre de l'étude communautaire réalisée en 1982 à l'occasion d'une épidémie de rougeole sévissant dans les kebeles de la localité de Konso, dans la province du Gamu-Gofa, on a enregistré des taux de mortalité compris entre 7,1 et 20,9 % chez les enfants de moins de 10 ans (des facteurs culturels, tels que le refus des injections au cours de l'épidémie et les relations étroites entretenues avec les membres de la famille vivant dans d'autres villages où des enfants étaient morts de la rougeole, ont favorisé la transmission de la maladie). Dans trois villages de la province rurale du Shewa, le taux d'infection par la rougeole a atteint 5,8 % lors d'une flambée épidémique. L'âge moyen des patients était de 9 ans et le taux de létalité était de 6,2 %. Aucun des enfants touchés n'avait été vacciné.

La surpeuplement et la disparition des anticorps maternels semblent être les principaux facteurs impliqués dans l'épidémiologie de la rougeole en Éthiopie.

Une étude de prévalence fondée sur des tests ELISA, menée à Addis-Abeba sur 286 enfants de moins d'un an non vaccinés, a montré que 75 % des moins de 6 mois présentaient des anticorps maternels, contre 30 % des 6-12 mois. Dans ce dernier groupe, le taux d'anticorps a considérablement diminué à mesure que l'âge a augmenté. Dans cette étude, le profil d'anticorps maternels montre que les enfants éthiopiens ne sont plus protégés à partir de l'âge de 9 mois. Dans le cadre d'une autre étude communautaire menée dans le woreda de Debré Markos, situé dans la zone administrative Misraq Godjam, l'incidence de la rougeole atteignait 7,5 % chez les 280 enfants non vaccinés, contre 0,3 % chez les enfants vaccinés.

La rougeole est présente dans le monde entier. Il n'existe qu'un seul sérotype. L'homme est le seul réservoir connu. Il s'agit d'une maladie très contagieuse qui affecte près de 90 % des contacts familiaux sensibles. Des programmes de vaccination efficaces, comme ceux mis en œuvre en Europe et en Amérique du Nord, ont permis de faire reculer significativement les cas de rougeole. Toutefois, cette maladie demeure un

problème de santé majeur dans les régions où la couverture vaccinale est faible, comme l'Afrique subsaharienne. La transmission se fait principalement de personne à personne par les gouttelettes de toux en suspension dans l'air, ou par contact direct avec les sécrétions nasales ou orales des personnes infectées. Les patients sont contagieux un à deux jours avant l'apparition des symptômes et jusqu'à quatre jours après l'apparition de l'éruption cutanée. La contagion est maximale pendant la phase prodromique. Le délai moyen entre l'infection et la survenue des symptômes, puis l'apparition de l'éruption cutanée, se monte respectivement à 10 et 14 jours.

3.1.4 Pathogenèse

Le virus de la rougeole pénètre dans l'organisme par inhalation, envahit l'épithélium respiratoire et se propage par la circulation sanguine jusqu'au système réticulo-endothélial, à partir duquel il infecte toutes les catégories de leucocytes, d'où l'atteinte de la peau, des voies respiratoires et d'autres organes. L'infection de ces sites se manifeste par l'apparition d'une éruption cutanée et de symptômes classiques comme la toux, la conjonctivite et la rhinite. Une atteinte généralisée des voies respiratoires associée à une perte de cils vibratiles expose à une infection bactérienne secondaire, comme la pneumonie ou l'otite moyenne. La réaction immunitaire qui se produit dans les cellules endothéliales des capillaires du derme joue un rôle dans le développement du signe de Koplik et de l'éruption cutanée. Dans l'encéphalite rougeoleuse, les changements pathologiques sont les suivants : hémorragie localisée, congestion et démyélinisation périvasculaire. L'invasion directe des lymphocytes T pourrait jouer un rôle dans la dépression immunitaire transitoire.

3.1.5 Prévention et lutte contre la rougeole

Outre ce qui figure dans le chapitre « Prévention et lutte » du module central, les agents de santé doivent être en mesure de comprendre et de mettre en œuvre des solutions de gestion améliorées :

Améliorer les compétences de gestion en ce qui concerne la promotion de la couverture vaccinale, par l'organisation d'une formation interne et la mise en

œuvre d'une supervision ;

Concevoir des stratégies innovantes d'amélioration de la couverture vaccinale ;

Développer des

processus d'organisation, de planification, de mise en œuvre et d'évaluation du PEV. Elles sont également chargées d'effectuer les recherches qui s'imposent afin d'améliorer la qualité des services fournis aux patients atteints de rougeole, et d'élaborer des stratégies de prévention et de lutte contre la maladie. Ainsi, pour mener correctement à bien les activités ci-dessus, il est essentiel que les infirmières acquièrent priualemles

- Toute information relative à l'épidémie de rougeole, notamment chez les enfants de moins de cinq ans

Examen physique

- Examens physiques pertinents
- Système tégumentaire
- Évaluations du système respiratoire
- Évaluation nutritionnelle et développementale (croissance, taille musculaire, circonférence du bras, circonférence de la tête)
- Équilibre liquidien et électrolytique
- Statut mental
- Signes vitaux
- Enquête communautaire sur le statut de l'immunité de groupe et la répartition de la maladie

2.

se trouve face à soi ;

- Remplir la seringue avec 0,5 ml de vaccin reconstitué ;
- Tenir le bras de l'enfant et pincer sa peau ;
- Insérer l'aiguille en sous-cutané à un angle de 45° dans le bras gauche et presser le piston avec le pouce pour injecter le vaccin ;
- Retirer l'aiguille et la jeter dans le conteneur à aiguilles usagées.
- Protéger le vaccin contre la lumière directe du soleil afin de préserver son efficacité.

NB : Administrer la dose appropriée aux enfants éligibles au site d'injection approprié :

Âge de l'enfant	9 mois
Dose	0,5 ml
Voie	sous-cutanée
Site d'injection	bras gauche
Nombre de doses	dose unique dans la plupart des cas

NB : la vaccination contre la rougeole peut être pratiquée chez les nourrissons dès l'âge de 6 mois en cas d'épidémie ou de famine (connue pour augmenter la mortalité due à la rougeole)

Organisation de visites à domicile et surveillance active ;

Mobilisation et implication des communautés ;

Collaboration avec les agents de santé communautaire ;

Promotion des mesures intersectorielles en faveur de la vaccination contre la rougeole (exemples : enseignants, agents de vulgarisation agricole) ;

Consignation et transmission correcte des informations ;

Établissement d'une communication avec l'administration des woredas, le Département régional de santé et/ou le Bureau régional de santé ;

Mise en place d'une éducation sanitaire de base dans les écoles, les instituts de santé, à domicile et dans les milieux communautaires ;

Promotion d'un service de soin intégré réservé aux enfants.

Instructions à l'intention des mères :

Informer la mère que l'enfant est susceptible d'avoir de la fièvre pendant 1 à 3 jours ou environ une semaine après la vaccination contre la rougeole, et qu'une légère éruption cutanée est susceptible d'apparaître.

Rassurer la mère en lui disant que c'est une éruption vraiment bénigne, qui disparaît d'elle-même.

3.2.8 Test d'évaluation :

Instructions : entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. .Le vaccin contre la rougeole est administré par voie :
   a. Intradermique
   b. Intramusculaire
   c. Sous-cutanée
   d. Intraveineuse
2. .La dose appropriée de vaccin à administrer se monte à :
   a. 0,01 ml
   b. 0,05 ml
   c. 0,5 ml
   d. 0,1 ml
3. De quels types de soins infirmiers les patients rougeoleux ont-ils besoin ?
   a. Soins palliatifs
   b. Soins de soutien
   c. Soins de réadaptation
   d. Soins de fin de vie
4. La température appropriée pour le maintien de la chaîne du froid est comprise entre 2 et 8 ^{0}C. Il convient donc de surveiller la température du réfrigérateur. Combien de fois par jour l'infirmière doit-elle vérifier le thermomètre ?
   a. Quatre fois
   b. Deux fois
   c. Trois fois

d. Six fois

5. Le groupe cible de la vaccination contre la rougeole est :
   a. L'ensemble des enfants de moins de cinq ans
   b. L'ensemble des enfants de moins d'un an
   c. L'ensemble des enfants tous âges confondus
   d. Toutes les mères âgées entre 15 et 49 ans
6. Parmi les diagnostics infirmiers suivants, lequel pourrait s'appliquer à un patient rougeoleux ?
   a. Modification de la température corporelle
   b. Modification de l'équilibre des liquides et des électrolytes
   c. Infections des voies respiratoires inférieures
   d. Réponses A et B
   e. Toutes les réponses ci-dessus

3.3. Module satellite destiné aux responsables de l'hygiène de l'environnement

3.3.1. Introduction

La vaccination des segments vulnérables de la population reste l'un des meilleurs moyens de prévention des maladies infantiles infectieuses. La fourniture de ce service fondamental aux personnes à risque relève de la responsabilité de l'ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur niveau. Ainsi, chaque catégorie de professionnels de santé a un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre les maladies contagieuses. Les professionnels de l'hygiène de l'environnement sont supposés contribuer plus largement aux activités de prévention des maladies, dont font partie les programmes de vaccination. Ce module satellite vise donc à souligner et à présenter les activités pratiques spécifiques qui doivent être mises en œuvre par ces professionnels afin d'assurer une prévention et lutter contre la rougeole en Éthiopie.

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne constitue pas un mode de transmission de la rougeole ?
   a. Gouttelettes de salive
   b. Droplet nuclei (résidus d'aérosols)
   c. Contact direct avec une personne infectée
   d. Consommation d'eau issue de sources non protégées

4. Les méthodes fondamentales de prévention et de lutte contre la rougeole sont les suivantes :
   a. Isolement des patients infectés
   b. Désinfection des objets souillés (contaminés) par les sécrétions nasopharyngées
   c. Vaccination (active ou passive) des enfants
   d. Mesures efficaces de lutte antivectorielle

5. Parmi les comportements suivants, lesquels relèvent de pratiques erronées/de préjugés sur la maladie ?
   a. Empêcher l'enfant de prendre une douche ou un bain
   b. Ne jamais ouvrir les portes et les fenêtres de la chambre du patient
   c. Garder tous les enfants au contact du patient afin qu'ils attrapent la maladie et soient ainsi immunisés
   d. Empêcher systématiquement le patient d'absorber des liquides jusqu'à sa guérison

6. Parmi les mesures suivantes, laquelle est susceptible de compromettre la réussite des programmes de vaccination ?
   a. Impliquer les dirigeants des communautés locales
   b. Impliquer les responsables religieux locaux
   c. Informer la communauté des bénéfices des programmes de vaccination
   d. Forcer les mères réticentes à emmener leurs enfants dans les centres de

peut pas être guéri par un ‘Hakim’. J’ai fait tout mon possible, mais je ne suis pas parvenue à les convaincre. J’étais en train de me rendre chez la police quand mon ami m’a dit que vous êtes l’un des ‘Hakims’ » de mon centre de santé. »

Baraso souhaite poser certaines questions, mais voilà qu’ils arrivent à destination. Ils se trouvent dans la zone dite de « Chesches tera », l’une des plus sordides du kebele en question. L’inspecteur sanitaire se souvient l’avoir visitée et avoir évoqué les mauvaises conditions de logement et d’assainissement régnant dans cette zone, peuplée de nombreux enfants.

Il entre à la suite de Damenech dans une vieille maison ne comportant qu’une seule pièce. Il fait sombre à l’intérieur, et l’atmosphère est suffocante. Au bout d’un moment, il parvient à distinguer quatre personnes – une femme, deux hommes et un garçonnet, dont il s’avérera ensuite qu’il s’agit du père, de l’herboriste local, de la mère et de l’enfant, qui est allongé au sol sur un petit morceau

L’approche épidémiologiqu

vaccinés, etc. Pour plus de détails, référez-vous au module central.

2. Lutte contre la rougeole :

- *Ventilation :* la ventilation de la pièce dans laquelle réside le patient rougeoleux permet d'évacuer ou de diluer l'air devenu stagnant. Elle réduit les risques d'infection des contacts (personnes en bonne santé). Il convient de ventiler convenablement à la fois les établissements de santé où les patients rougeoleux sont admis, et leur domicile. L'inspecteur sanitaire doit vérifier que le volume d'air de la chambre se monte à 28 m^3 par personne au minimum, et que les fenêtres sont maintenues ouvertes afin de garantir une bonne circulation de l'air dans la pièce ;

- L'inspecteur sanitaire doit mener des enquêtes régulières sur la rougeole. Il doit également procéder à une identification des zones en établissant une cartographie des villages (plan quadrillé) ;
- *Désinfection :* elle implique la destruction immédiate du virus de la rougeole sur l'ensemble, des objets contaminés par les sécrétions nasopharyngées de laoa6(a)10(a60

a. Empêcher l'enfant de prendre une douche ou un bain
b. Ne jamais ouvrir les portes et les fenêtres de la chambre du patient
c. Garder tous les enfants au contact du patient afin qu'ils attrapent la maladie et soient ainsi immunisés
d. Empêcher systématiquement le patient d'absorber des liquides jusqu'à sa guérison

6. Parmi les mesures suivantes, laquelle est susceptible de compromettre la réussite des programmes de vaccination ?
   a. Impliquer les dirigeants des communautés locales
   b. Impliquer les responsables religieux locaux
   c. Informer la communauté des bénéfices des programmes de vaccination
   d. Forcer les mères réticentes à emmener leurs enfants dans les centres de vaccination

3.4. Module satellite destiné aux techniciens des laboratoires d'analyses de biologie médicale

3.4.1. Introduction

Ce module vise à permettre aux techniciens des laboratoires d'analyses de biologie médicale d'acquérir les connaissances, attitudes et compétences nécessaires pour établir le diagnostic de la rougeole en laboratoire, en accordant une attention particulière aux types d'échantillons, leur prélèvement et leur transport.

3.4.2. Instructions d'utilisation de ce module satellite

Lisez les informations contenues dans le module central ;

Répondez aux questions du test préliminaire ;

Lisez attentivement les informations du module satellite ;

Répondez aux questions du test d'évaluation ;

Consultez les solutions des tests préliminaires et d'évaluation en annexe.

peuvent remplacer le sang, qui est indispensable au diagnostic sérologique.

Méthode de diagnostic du virus de la rougeole en laboratoire :

Le virus de la rougeole peut être diagnostiqué au laboratoire à l'aide des méthodes suivantes :

Isolement du virus sur une culture de cellules de rein fœtal humain ou une autre culture cellulaire, et observation des effets cytopathiques spécifiques causés par le virus, qui est confirmé au moyen d'antisérums spécifiques ou par PCR.

Examen du virus au microscope électronique directement dans les échantillons cliniques ;

Tests sérologiques **;**

Examen histologique **et** hybridation de l'acide ribonucléique (ARN).

Tests sérologiques pour le diagnostic du virus de la rougeole

Il est plus efficace et plus facile de rechercher les anticorps spécifiques du virus de la rougeole que d'isoler le virus à partir d'un échantillon clinique.

- Dans les cas de rougeole aiguë non compliquée, une hausse significative des

c. l'eau
d. un mauvais esprit

2. La rougeole se transmet par :
   a. ingestion
   b. inhalation des gouttelettes en suspension dans l'air
   c. contact
   d. le mode de transmission est inconnu

3. La rougeole touche principalement :
   a. les enfants de tous âges
   b. les enfants de plus de 9 mois
   c. les mères et les enfants
   d. on ne sait pas

4. La prévention de la rougeole passe par :
   a. la vaccination
   b. la cérémonie du café
   c. l'éducation sanitaire
   d. un traitement

3.5.3 Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce module, les agents de santé communautaires seront en mesure de :

Définir la rougeole ;

Nommer l'agent responsable ; lesd.002 Tw Tw c -0.004 T2 289(s)4.004

La rougeole est une maladie aiguë hautement contagieuse, causée par le virus de la rougeole (germe). Elle se caractérise par de la fièvre, un écoulement nasal, une toux, une rougeur des yeux et une éruption cutanée.

3.5.5 Épidémiologie

La rougeole affecte majoritairement les enfants non vaccinés à partir de l'âge de 9 mois. Elle touche la majeure partie des régions d'Éthiopie. La transmission aux

Bonne hygiène personnelle

Traitement de la fièvre par des antipyrétiques (administrer du paracétamol, mais pas d'aspirine)

Informations sur l'administration des médicaments prescrits

Soutien nutritionnel

3.5.8 Prévention et lutte contre la rougeole

Organiser une enquête porte à porte

Axer l'éducation sanitaire sur l'importance de la vaccination contre la rougeole

Mobiliser l'ensemble des enfants éligibles à la vaccination

Améliorer les conditions de logement :

- Éviter le surpeuplement
- Assurer une bonne ventilation

Améliorer le statut nutritionnel

3.5.9 Test d'évaluation

Instructions

b. les enfants de plus de 9 mois

c. les mères et les enfants

d. on ne sait pas

4. La prévention de la rougeole passe par :

a. la vaccination

b. la cérémonie du café

c. l'éducation sanitaire

d. un traitement

3.6 Points importants à retenir par toute personne ayant la charge d'enfants

3.6.1 Définition

Ce chapitre s'adresse à toute personne ayant la charge d'enfants, c'est-à-dire à tout homme ou femme, quel que soit son âge, à qui la prise en charge ou les soins des enfants malades incombe en premier lieu.

3.6.2 Message à l'intention des personnes ayant la charge d'enfants :

Nous souhaitons vous remercier pour votre participation et votre implication dans la prise en charge et la prévention de la rougeole. Gardez toujours à l'esprit les points suivants :

- La rougeole est causée par un germe nommé « virus de la rougeole »
- La transmission de la rougeole est uniquement interhumaine
- La rougeole touche plus particulièrement les enfants, et notamment les enfants non vaccinés
- Si l'enfant présente de la fièvre, une éruption cutanée et une toux, amenez-le immédiatement dans un établissement de soins tel qu'un poste sanitaire, un centre de santé ou un hôpital
- Poursuivez l'allaitement le cas échéant, et apportez un soutien nutritionnel complémentaire si nécessaire

Veillez à

PARTIE 4

ABRÉVIATIONS

ARN	-	Acide ribonucléique
ASC	**-**	Agent de santé communautaire
CS		Centre de santé
ELISA	**-**	Enzyme Linked Immunosorbent Assay
IEC	-	Information, éducation et communication
IMC	-	Immunité à médiation cellulaire
MPE		Malnutrition protéino-énergétique
OMS	-	Organisation mondiale de la santé
PEV	-	Programme élargi de vaccination
PCIME		Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant

PARTIE 6

ANNEXE

6.1 Réponses

6.1.1 Tests préliminaire et d'évaluation du module central sur la rougeole :

1. b
2. a, b, c et d
3. a, b, c et d
4. c
5. a, b, c et d
6. b
7. a, b, c et d
8. d
9. b, c et d
10. a, b, c et d

6.1.2 Tests préliminaire et d'évaluation du module satellite à l'intention des infirmières de santé publique :

1. c
2. c

3(,)10(c)2( )]TJ 0.004 Tc -0.004 Tw (et T7 0 T

1. a 2. b 3. b 4. a

PARTIE 7

GLOSSAIRE

Auto-immunisation - état pathologique des mécanismes de défense de l'organisme, qui produit des anticorps (auto-anticorps) contre ses propres constituants, et les traite comme des corps étrangers en les attaquant.

Catarrhal - qui est caractérisé par des sécrétions anormalement abondantes des muqueuses du système respiratoire

Chaîne du froid - suite d'opérations visant à préserver l'efficacité d'un vaccin en le maintenant à une température stable entre le moment de sa fabrication et le moment de son administration à une femme ou un enfant.

Encéphalite - inflammation du cerveau

Éradication – suppression totale d'une infection par extermination de l'agent infectieux au moyen d'une stratégie de surveillance et d'endiguement.

Laryngotrachéobronchite aiguë (croup) – infection sévère et presque exclusivement virale des voies respiratoires, touchant plus particulièrement les jeunes enfants, et susceptible de causer une obstruction du larynx ou des principaux conduits aériens (bronches) en raison de l'épaisseur et de la viscosité du liquide (exsudat) produit par les tissus enflammés.

Maladie auto-immune – maladie due à réaction inappropriée du système immunitaire contre l'organisme

Morbidité - Nombre (absolu ou relatif) des malades dans un groupe déterminé à un moment donné.

auprès des personnes concernées afin que des mesures soient prises.

Taux d'incidence – Mesure de la fréquence à laquelle un événement, comme l'apparition de nouveaux cas d'une maladie, survient dans une population sur une période de temps donnée.

Taux de létalité – proportion de décès causés par une maladie chez les personnes ayant eu cette maladie.

Vaccination - protection des individus sensibles contre les maladies transmissibles par l'administration d'un agent vivant modifié, d'une suspension d'organismes tués ou d'une anatoxine.